

Planungshilfen zur Auswahl von geeigneten Klein- und Kugelbäumen

Diese Tabelle umfasst 12 schöne Klein- und Kugelbäume, die sich auch zur Pflanzung auf beengten Pflanzplätzen - wie sie häufig in Vorgärten anzutreffen sind - eignen. Die Höhenangaben veredelter Gehölze sind immer in Abhängigkeit der Veredlungshöhe zu betrachten – es gibt Baumschulen, die Halbstämme mit einem Kronenansatz von 100 und 160 cm m kultivieren – bei uns in der Baumschule erziehen wir die Kronen ausschließlich als Hochstämme mit Kronenansätzen zwischen ca. 200 und 220 cm

Bäume	Kronenform	Größe	Blüte/ Blütezeit	Herbstfärbung	Früchte
Acer platanoides ‘Globosum’ Kugel-Ahorn	Kugelbaum, Krone kugelig, später platt-/ breit-kugelig, dicht	H 6 m (je nach Veredlungshöhe) x B 6 - 7 m	gelbgrün in endständigen Doldentrauben vor dem Austrieb, Blütezeit IV	gelb bis goldgelb	typische Spitzhorn-Propeller-Früchte
Carpinus betulus ‘Fastigiata’ Pyramiden-Hainbuche	pyramidale bis birnen- oder zwiebel-förmige, dicht geschlossene Krone	H 12 – 15 m x B 4 - 5 m	männliche Kätzchen (gelb), weibliche Kätzchen grün, unauffällig	leuchtend gelb, Blätter teils lang haftend	Nüsschen in hellgrünen Büscheln
Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’ Schmale Pyramiden-Hainbuche	schmal-pyramidale, geschlossene Krone	H 12 – 15 m x B ca. 3 m	männliche Kätzchen (gelb), weibliche Kätzchen grün, unauffällig	leuchtend gelb Blätter teils lang haftend	keine Früchte
Catalpa bignonioides ‘Nana’ Kugel-Trompetenbaum	Kugelbaum, Krone kugelig, später platt-/ breit-kugelig	H 6 m (je nach Veredlungshöhe) x B 6 - 7 m	<u>keine</u> Blüten (im Unterschied zur Art !)	hellgelb	<u>keine</u> Früchte (im Unterschied zur Art !)

Bäume	Kronenform	Größe	Blüte/ Blütezeit	Herbstfärbung	Früchte
Crataegus x laevigata ‘Paul’s Scarlett’ Echter Rotdorn	breit-kegelförmige bis im Alter eher runde und halboffene Krone mit auslandenden Seitenästen	H 6-8 m x B 3 – 5 m	Leuchtend karmesinrote Blüten, gefüllt in Dolden, Blütezeit V	Nicht nennenswert	keine Früchte
Fraxinus ornus ‘Mecsek’ Kugelförmige Blumen-Esche	kugelförmige, halboffene Krone, langsam wachsend	H 6 m (je nach Veredlungshöhe), Breite bis ca. 6 m	Cremeweiße Rispen, erscheinen erst an älteren Bäumen, Blütezeit V – VI	Goldgelb bis bronzeviolett, Laub manchmal auch nur grün abfallend	geflügelte Nüsschen, nur geringer Fruchtansatz
Ginkgo biloba ‘Mariken’ Kugel-Ginkgo	kompakte und schwach wachsende kugelförmige Krone	H 4 m (je nach Veredlungshöhe) x Breite 1,50 m	Zweihäusig, männliche Kätzchen, gelbgrün, weibliche Blüten langgestielt	leuchtend gelb	mirabellenähnliche Früchte, stinkend wenn abgefallen (nur bei weiblichen Bäumen)
Ilex ‘Nellie R. Stevens’ Stechpalme	ungeschnitten mit breit-pyramidalen, kompakter Krone	H bis ca. 8 m x B 3 – 4 m (wenn freiwachsend)	kleine weiße Blüten, männliche Blüten ohne Fruchtknoten und Narbe, V - VI	immergrün	leuchtend rote Steinfrüchte, langhaftend, Winterzierde, giftig (wie das gesamte Gehölz)
Liquidambar styraciflua ‘Gum Ball’ Kugel-Amberbaum	Kugelige Krone, später abgeflacht, dichtkronig	H 4 m (je nach Veredlungshöhe) x B ca. 2-3 m	gelbgrün, unauffällig	orangegelb bis violett, schwächer als bei der Art	gestielte, stachelige runde Kapsel Früchte, ähnlich wie die Früchte von Platanen

Bäume	Kronenform	Größe	Blüte/ Blütezeit	Herbstfärbung	Früchte
Photinia x fraseri 'Red Robin' Glanzmispel	kugelige Krone, abgeplattet, dichttriebzig	H bis etwa 5 m (je nach Erziehungshöhe des Stamms) x B 2 - 3 m	weiß in breiten Trugdolden, Blütezeit Ende IV bis VI	Einzelne Blätter rot verfärbt, wintergrünes Gehölz	Rote Steinfrüchte, beliebt bei Vögeln, giftig für Menschen
Prunus fruticosa 'Globosa' Kugel-Steppen-Kirsche	Kugelbaum, dicht- und feintriebzig, schwach wachsend	H 4 - 5 m (je nach Veredlungshöhe) x B ca. 2,50 m	weiß in langgestielten Dolden, Blütezeit IV bis V	orangegelb, jedoch kein sicherer Färber, früher Laubabwurf	erbsengroße, dunkelrote Kirschen, sauer, nicht giftig
Quercus palustris 'Green Dwarf' Kugel-Sumpf-Eiche	Kugelbaum mit gleichmäßig kugelig- rundlicher Krone	H 4 m (je nach Veredlungshöhe) x B ca. 2,50 m	goldfarbene männliche Kätzchen	rotgelb, intensiv	abgeflacht-kugelige kleine Eicheln
Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' Kugel-Robinie	kugelig-rundliche Krone, später flachere bis schirmförmige Krone	H 6 (-8) m (je nach Veredlungshöhe) x B bis ca. 6 m	blüht nicht	färbt nicht	keine Früchte, vor allem die Rinde ist giftig